



Берегите свою жизнь, свой дом и нашу природу!

Необходимо знать, что иксодовые клещи являются переносчиками возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма (боррелиоза) и некоторых других инфекций.

Клещевой энцефалит – опасное вирусное заболевание центральной нервной системы, приводящее к инвалидности и даже смерти.

Болезнь Лайма опасна развитием поздних стадий с поражением кожи, суставов, нервной системы, сердца, глаз и т.д.

Для исследования снятого клеща необходимо поместить в стеклянный флакон. На дно флакона необходимо положить марлю, предварительно смоченную водой или травинку. Флакон закрыть пробкой. Хранить такого клеща следует в прохладном месте.



Наш адрес:

633371, Новосибирская область, Болотнинский р-он, село Варламово, ул. Садовая
тел. 8-383-49-49272

сот. 89231081708

E-mail: kosmovskij.sergej@yandex.ru

<http://green-kedr.ucoz.ru>

Руководитель: педагог дополнительного образования ДДЮ, учитель биологии и химии Космовский Сергей Сергеевич

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
Варламовская средняя
общеобразовательная школа

ОСТОРОЖНО- ЭНЦЕФАЛИТ!



Клещевой энцефалит это природно-очаговое острое вирусное заболевание, возникающее в результате инфицирования человека вирусом. Источником инфекции являются преимущественно грызуны. Резервуаром и переносчиком - иксодовые клещи. Зараженность клещей вирусом энцефалита составляет от 10 до 30%. Зараженный организм человека практически не является источником инфекции.

Человек заражается при укусе (присасывании) клеща, а также алиментарным путем при употреблении в пищу сырого молока и молочных продуктов, наиболее опасным является молоко инфицированных коз. В сметане и масле вирус сохраняется до 2-х месяцев.

Инкубационный период заболевания продолжается от 7 до 23 дней (в среднем 1-2 недели).

Большинство случаев заболевания протекают со слабо выраженными клиническими признаками, однако отмечаются и тяжелые формы с поражением головного и спинного мозга, с развитием стойких неврологических нарушений, приводящих к инвалидности. Смертность от клещевого энцефалита может достигать до 25% от общего числа заболевших.

Традиционные места обитания клещей - это трава и кустарники высотой до 1,5 м, открытые и солнечные участки леса.

Клещ чувствует приближение человека на расстоянии до 10 м (тепло, которое излучает тело) и готовится к нападению.



В целях профилактики заболеваемости клещевым энцефалитом рекомендуется:

1. При выходе в зеленую зону иметь одежду, плотно прилегающую к телу, куртки заправлять в брюки, брюки в сапоги, рукава и ворот должны быть застегнуты.

2. В целях обнаружения клещей каждые 2 часа проводить само - и взаимоосмотры открытых частей тела и поверхности одежды.

3. При жаркой погоде, когда нет возможности надевать плотно прилегающую одежду, перед выходом в зеленую зону применять репелленты (мази и лосьоны, отпугивающие насекомых, «Тайга», «Дэта»).

4. При присасывании клещей немедленно обратиться в ближайшее лечебное учреждение.

5. Самостоятельное удаление клеща допускается, если нет возможности обратиться в мед. учреждение.

При этом необходимо соблюдать следующие правила:

- сначала оттянуть присосавшегося клеща пальцами и на головную часть у самой поверхности кожи наложить нитяную петлю. Осторожными покачиваниями, не совершая резких движений, за оба конца нити извлекают клеща вместе с хоботком.
- тем же способом, после наложения нитяной петли захватить оба конца нити и закручивающими движениями по спирали удалить клеща.
- если остался хоботок в теле человека, его удаляют обожженной иглой или булавкой.
- место укуса обработать йодом.

